

¿Ventajas del tratamiento con el láser de Tulio?

- Tratamiento mínimamente invasivo que permite una rápida recuperación y una corta estancia hospitalaria.
- Indicado, especialmente, en pacientes de alto riesgo (cardíacos tratados con anticoagulantes y antiagregantes), etc...
- Menor tiempo de sondaje vesical, disminuyendo la posibilidad de infección urinaria.
- Mejora de los cuestionarios de calidad de vida.
- Sin transfusiones sanguíneas (menor riesgo de infección).
- Baja tasa de incontinencia urinaria, eyaculación retrógrada y disfunción eréctil.
- Mejora del flujo urinario máximo y disminución del volumen residual postmiccional.
- Posibilidad de obtener tejido para anatomía patológica.

Los pacientes requieren intervenciones eficaces y mínimamente invasivas que les proporcionen una mayor calidad de vida.



medipro
COMPAÑÍA EUROPEA DE PRODUCTOS MÉDICOS, S.L.



Avenida Quitapesares, 8, Nave 8 - Par. Emp. Villapark
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel. 91 616 58 14 - Fax 91 616 57 83
medipro@grupoeucon.com - www.grupoeucon.com

Láser de Tulio

Tratamiento de la Hiperplasia Benigna de Próstata




medipro

Láser de Tulio

¿Qué es la próstata?

Es una glándula del tamaño de una nuez situada justo debajo de la vejiga y alrededor de la uretra masculina, que es el conducto que permite el paso de la orina, desde la vejiga.



A medida que los hombres envejecen, la próstata aumenta de tamaño, lo que provoca el estrechamiento progresivo del canal uretral con el consecuente problema de disminución del chorro miccional (dificultad para orinar), y todos los síntomas característicos de la Hiperplasia Benigna de Próstata.

¿Qué es la Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP)?

Es una de las patologías benignas más frecuentes en los varones, originada por el aumento del tamaño de la próstata. El tratamiento quirúrgico va dirigido a disminuir los síntomas urinarios obstructivos que aparecen en el paciente, mejorando su calidad de vida.

Afecta a más del 40% de los varones mayores de 50 años.

¿Cuáles son los síntomas habituales?

- Micción frecuente, especialmente por la noche (nicturia).
- Dificultad para comenzar la micción.
- Flujo de orina intermitente y/o débil.
- Sensación de vaciado incompleto de la vejiga.
- Necesidad de orinar de nuevo en menos de dos horas desde la última micción (polaquiuria).
- Incontinencia (pérdidas involuntarias de orina).
- Sangre en la orina (hematuria).
- Dolor durante la micción (disuria).
- Urgencia urinaria.

¿Qué tratamientos existen para tratar este crecimiento benigno?

El tratamiento de referencia es la Resección Transuretral (RTU), pero en los últimos años se han desarrollado novedosas alternativas, entre las que destacan diferentes técnicas de vaporización con láser.

Existen varios tipos de láser para el tratamiento quirúrgico de la HBP.

¿Por qué elegir el láser de Tulio?

- La elección depende de muchos factores. De entre todos, el láser de Tulio de 120 W, de última generación, se presenta como la solución ideal al tratamiento de la HBP. Tiene una elevada capacidad de vaporización y también permite la vaporresección, lo que se traduce en una disminución del tiempo quirúrgico.
- Su exclusiva longitud de onda (1,9 μm .) permite actuar sobre el tejido prostático de la forma más óptima y eficaz posible.
- Mínimos efectos secundarios.
- Eliminación del Síndrome de Reabsorción (SRTV).

